

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 16-4-65 BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION de la STATION de BORDEAUX (Tél. 92-26-94)

ABONNEMENT ANNUEL
15 NF

(GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&-GARONNE, LANDES,
BASSES-PYRÉNÉES, CHARENTE, CHARENTE-MARITIME)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Chemin d'Artiques, CENON (Gironde)
C. C. P. : BORDEAUX 6707-65

Supplément N° 2 au Bulletin Technique N° 55 d'Avril 1965

1965-I0

AVERTISSEMENTS

VIGNE

Black-Rot : Comme nous le laissons prévoir, des projections d'Ascospores ont eu lieu au cours des dernières pluies. Elles risquent de devenir plus importantes dans les jours prochains.

Aussi, nous rappelons l'intérêt d'un traitement dans les vignes atteintes l'an dernier pu se trouvant près des parcelles incultes et dont le débourrement est bien avancé. Dans une telle situation, des vignes peu développées la semaine dernière, peuvent être actuellement contaminables.

ARBRES FRUITIERS

Tavelures des Poiriers et des Pommiers : Sur les variétés de Poiriers à débourrement précoce non traitées, des taches parfois nombreuses viennent d'apparaître sur les pédoncules et les jeunes feuilles. En outre, les pluies de ces derniers jours ont provoqué d'importantes projections d'Ascospores à partir des feuilles tombées sous les Poiriers et les Pommiers. Elles se poursuivront dans les jours à venir et s'ajouteront aux contaminations secondaires désormais possibles.

En conséquence, nous préconisons un nouveau traitement dès à présent à cause du délavage des produits et aussi pour protéger la nouvelle végétation.

Hoplocampes des Prunes : En raison du mauvais temps de ces derniers jours, l'activité des insectes a été faible et les pontes sont peu nombreuses.

Les éclosions auront lieu en général à partir du 17 avril, mais les attaques resteront faibles.

Néanmoins, un traitement est conseillé entre le 16 et le 21 avril. Utiliser une spécialité à base de H.C.H., de Parathion ou mieux d'Oléoparathion.

Acarie : Les conditions climatiques de ces derniers jours n'ont pas favorisé les éclosions des oeufs d'hiver de *Panonychus ulmi*. Nous rappelons cependant, l'intérêt d'un traitement immédiat dans les vergers situés sur les versants les mieux exposés des Basses-Pyrénées, des Landes et du Lot et Garonne.

INFORMATIONS

Tavelure du Pêcher : Dans les vergers où la Tavelure se manifeste, on peut utiliser une spécialité organique de synthèse (TMTD, Captane, Zinèbe) ou un Soufre micronisé.

Bordeaux, le 15 avril 1965

Le Contrôleur chargé des Avertissements
C. ROUSSEL

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux
J. BRUNETEAU

Imprimerie de la Station de Bordeaux
Directeur-Gérant: L. BOUYX

7163